Proteja a su niño de la **varicela**

La varicela es una enfermedad que puede ser grave para niños y adultos. Antes que tuviéramos la vacuna, 11 000 personas eran hospitalizadas y cerca de 100 morían a causa de la varicela cada año en los Estados Unidos. La mayoría de las muertes ocurrieron en niños y adultos previamente saludables.

La varicela usualmente causa fiebre y un brote en la piel de la cabeza a los pies con ampollas que dan picazón y que se pueden infectar y dejar cicatrices. La varicela también puede causar neumonía, encefalitis (hinchazón del recubrimiento del cerebro), infecciones de la piel y sangre e incluso la muerte.

La varicela se propaga fácilmente y puede pasarse de una persona a otra uno o dos días antes de que el brote en la piel aparezca. Se propaga por medio de la tos, los estornudos o por contacto directo con ampollas infectadas.

Acerca de la vacuna. Se recomiendan **2 dosis** de la vacuna contra la varicela. La primera dosis entre los **12 y 15 meses** de edad y la segunda entre los **4 y 6 años** (antes de entrar al kínder).

¿Por qué debe mi niño obtener esta vacuna? La varicela puede ser una enfermedad leve, pero a veces también grave para algunas personas. No hay forma de predecir quién enfermará y sufrirá complicaciones. Las personas que tienen la enfermedad pueden contagiar a otras personas, quienes pueden estar en alto riesgo de enfermar gravemente. Los niños con varicela deben mantenerse alejados de la escuela y quedarse en casa hasta que todas sus ampollas sequen y formen una costra, lo que puede llevar más de una semana. Esto a menudo también significa que los padres pierden horas de trabajo.

Llame hoy a su doctor, enfermera o clínica para recibir la vacuna contra la varicela.

Después de la vacuna

Los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra la varicela son por lo general leves, tienden a causar dolor y enrojecimiento donde se aplicó la vacuna y en ocasiones una fiebre ligera. Un brote leve puede aparecer alrededor del sitio de la inyección hasta un mes después de ser vacunado. Efectos secundarios más serios casi nunca ocurren.

¿Puede mi niño ser vacunado y todavía desarrollar la varicela?

Algunos niños ya vacunados todavía pueden desarrollar la varicela debido a que ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, tales casos son generalmente leves y presentan menos de 50 ampollas.

Los niños vacunados son también menos propensos a tener fiebre y tienden a recuperarse más rápidamente. Además, aquellos que han sido vacunados son menos propensos posteriormente a padecer de la culebrilla.

Aprenda más

Visite la página web del Departamento de Salud: www.doh.wa.gov
Para encontrar una clínica de vacunación, llame a:

WithinReach

WithinReach Family Health Hotline
1-800-322-2588 (711 TTY relay)
or **www.ParentHelp123.org**

Washington State Department of Health

PUBLIC HEALTH
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND HEALTHIER WASHINGTON

Financiado parcialmente por el Programa Federal de Vacunas para Niños. Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-322-2588 o 711 (TTY relevador).

325-0158S DOH 348-110SP April 2014